

Le genre *Tomentellopsis* Hjortstam

Clé de Franck Dämmrich - traduction française de Ben Schultheis

7 espèces connues au niveau mondial, dont 6 attestées pour l'Allemagne (*en italique*)

Les dimensions sporales sont hors ornements et ne concernent que la longueur

- | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|---|
| 1a. | Système hyphal dimitique | <i>T. pallido-aurantiaca</i> | |
| 1b. | Système hyphal monomitique | | 2 |
| 2a. | Spores 4-5,5 µm | | 3 |
| 2b. | Spores 6-7,5 µm | | 4 |
| 3a. | Hyménophore brunâtre, spores subsphériques, quelques boucles éparses présentes aux hyphes | | |
| | | <i>T. pusilla</i> | |
| 3b. | Hyménophore jaunâtre, spores sphériques, hyphes sans boucles | <i>T. pulchella</i> | |
| 4a. | Spores régulièrement sphériques ou ellipsoïdales, aiguillons jusqu'à 2 µm, hyménophore brunâtre | <i>T. zygoesmoides</i> | |
| 4b. | Spores régulièrement sphériques à ellipsoïdales, aiguillons jusqu'à 1 µm, hyménophore crème, jaunâtre à verdâtre | | 5 |
| 5a. | Hyphes subiculaires à boucles éparses, spores ellipsoïdales en vue latérale, hyménophore verdâtre | <i>T. bresadoliana</i> | |
| 5b. | Hyphes subiculaires sans boucles, spores sphériques à largement ellipsoïdales | | 6 |
| 6a. | Spores jusqu'à 7,5 µm, en vue latérale largement ellipsoïdales, hyménophore crème à rose vif, souvent tacheté de rouge | <i>T. submollis</i> | |
| 6b. | Spores jusqu'à 6,5 µm, sphériques, hyménophore jaunâtre à verdâtre | <i>T. echinospora</i> | |